

เทคนิคการผลิตลำไยแบบมืออาชีพ

กับ

วันเดอร์แลนด์



“แค่นี้...ก็เป็นมืออาชีพได้แล้ว”

ขั้นตอนที่ 1 ระยะเวลาสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว

ทางใบ ใช้ “POWER# 5” อัตรา 200 ซี.ซี และ **Zukar Highway** อัตรา 200 ซี.ซี ต่อน้ำ 200 ลิตร (1 ถึง ยางมะตอย) ร่วมกับ “**ไบโอเจท**” 100 กรัม (1 ถ้วย) ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10

ทางดิน ใส่กรีนอัพ ต้นละ 1-2 กก. เพื่อช่วยให้ลำไยแตกใบอ่อนฟื้นฟูสภาพดิน พร้อมหว่าน “**ซอว์ล-แอสท์**” ไร่ละ 50-100 กิโลกรัม เพื่อปรับโครงสร้างดิน (กรณีที่ทำคาสารจำเป็นต้องใช้เป็นอ่าง)



ขั้นตอนที่ 2 ระยะเวลาสะสมอาหาร

ทางใบ ใช้ “POWER # 5” อัตรา 200 ซี.ซี และ **Zukar Highway** อัตรา 200 ซี.ซี ต่อน้ำ 200 ลิตร (1 ถึง ยางมะตอย) ผสมกับปุ๋ยเกร็ด 0-52-34 ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ทุก 7-10 วัน

ทางดิน ใช้ “**ซอว์ลโฟฟ**” ผสมน้ำ 100 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร (1 ถึง ยางมะตอย) ราดโคนต้น 1 ครั้ง พร้อมใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ต้นละ 1-2 กิโลกรัม เพื่อช่วยเพิ่มการสะสมอาหารและปรับสภาพดิน ให้โปร่งร่วนซุยพื้นฟูรากฝอยช่วยให้รากดูดกินปุ๋ยได้ดีขึ้น



ขั้นตอนที่ 3 ระยะราดสาร

ทางใบ ใช้โซเดียมคลอไรด์ อัตรา 300 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน (หลังราดสาร 7 วัน)

กรณีต้นใหญ่ : (ทรงพุ่ม 7 เมตร) ใช้โซเดียมคลอไรด์ อัตรา 700 กรัม ต่อน้ำ 70 ลิตร ต่อต้น ราดบริเวณทรงพุ่ม

กรณีต้นเล็ก (ทรงพุ่ม 3 เมตร) ให้ใช้ “**โซเดียมคลอไรด์**” อัตรา 300 กรัม ต่อน้ำ 70 ลิตร ต่อต้น



ทางดิน รดน้ำให้ชุ่มทุกๆ 3 วัน 3 ครั้ง หลังจากนั้นรดน้ำทุกวันๆ 7 วัน เพื่อช่อดอกคกช่อดอกแข็งแรงสมบูรณ์ช่วยยืดช่อ



ขั้นตอนที่ 4 ระยะเวลาช่อดอก

ทางใบ ใช้ “POWER # 5” อัตรา 200 ซี.ซี และ **Zukar Highway** อัตรา 200 ต่อน้ำ 200 ลิตร ผสม **ไบโอเจท** 100 กรัม (1 ถ้วย) ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่น 2-3 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน

ทางดิน รดน้ำให้ชุ่มทุกๆ 7 วัน เพื่อช่อดอกคกช่อดอกแข็งแรงสมบูรณ์ช่วยยืดช่อ



ขั้นตอนที่ 5 ระยะเวลาดอกบาน

ทางใบ ใช้ “อีเรเซอร์-1” อัตรา 200 ซี.ซี ผสม “POWER # 5” อัตรา 200 ซี.ซี ต่อน้ำ 200 ลิตร (1 ถังขางมะตอย) 1 ครั้ง ก่อนดอกบาน

ทางดิน ใช้ “ซอว์ลิฟท์” 100 กรัม ผสม “กรีนอัฟ” 25 กก. (1 กระสอบ) หว่านให้ทั่วทั้งต้น ต้นละ 1-2 กิโลกรัม รดน้ำมาากๆ ทุกๆ 7 วัน ช่วยในการฟื้นฟูรากฝอย ช่วยให้กินปุ๋ยดีขึ้น ช่วยผสมเกสร ขั้วเหนียว ช่วยเพิ่มการติดผล



ขั้นตอนที่ 6 ระยะติดผลอ่อน

ทางใบ ใช้ “อีเรเซอร์-1” อัตรา 200 ซี.ซี และ “POWER # 5” ผสมกับ ZUKAR Highway อัตรา 200 ซี.ซี (1 ถังขางมะตอย) ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10-15 วัน หลังติดผลอ่อน

ทางดิน ใส่ “กรีนอัฟ” รดน้ำมาากๆ ทุกๆ 7 วัน ลดการหลุดร่วงของผลอ่อน เร่งการสร้างเมล็ดลูกโตไว



ขั้นตอนที่ 7 ระยะเวลาเขียวพวง

ทางใบ ใช้ “POWER # 5” อัตรา 200 ซี.ซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ผสม “ไบโอเจ็ท” 100กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร (1 ถังขางมะตอย) ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10-15 วัน

ทางดิน ใส่ “กรีนอัฟ” รดน้ำมาากๆ ทุกๆ 7 วันช่วยในการลดการหลุดร่วงของผลอ่อน เปลือกหนา เร่งการสร้างเมล็ด ลูกโตไว



ขั้นตอนที่ 8 ระยะเวลาเม็ดในดำ

ทางใบ ใช้ “อีเรเซอร์-1” อัตรา 200 ซี.ซี ผสมกับ “POWER # 5” อัตรา 200 ซี.ซี และ ZUKAR Highway อัตรา 200 ซี.ซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ทุกๆ 7 วันและ ฉีดพ่นอีเรเซอร์-1 อีกต่างหาก 2 ครั้งสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยว

ทางดิน ใส่ “กรีนอัฟ” หรือปุ๋ยเคมี 0-0-50 รดน้ำมาากๆ ทุกๆ 7 วัน ช่วยในการขยายผลจัมโบ้ ลดการหลุดร่วง การแตกสีผิวลำใยเหลืองนวล



พืชทุกพืชต้องการการดูแลเอาใจใส่ดูแลลูกรักของคุณ : มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลพืชของคุณ

บริษัทออร์แกนอลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 99/122 หมู่ 8 ม.ชดลา (วงแหวนรัตนานิเวศน์) ถนนบางไผ่-หนองปราย อ.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-9654089, 084-8809595

สำนักงานภาคเหนือ : 221/8 หมู่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-246851 แฟกส์ 053-854035

สำนักงานภาคใต้ : 64/23 ถนนพอขุนทะเล หมู่ 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร./แฟกส์ 077-405618

สำนักงานภาคอีสาน : 301/80-81 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร./แฟกส์ 043-243221

สำนักงานภาคกลาง : 370 หมู่ 5 ต.ทางหลวง 340 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร/แฟกส์ 056-420500